



Consorzio ai sensi art. 19 Legge 164/92
Disciplinare D.M. 2/8/93 – G.U. 26/8/93 n. 200

Bollettino n°11-2026 del 16 Giugno 2026

Bollettino di difesa Integrata e Biologica della vite

Sintesi della situazione Fitosanitaria sul territorio bergamasco			
Peronospora	Oidio	Botrite	Tignoletta
			
Rischio Basso	Rischio Medio	Rischio Basso	Rischio Medio

Informazioni agrometeorologiche

BOLLETTINO AGROMETEO DELLE REGIONE LOMBARDIA

(Estratto dal bollettino della regione Lombardia)



LA SETTIMANA DAL 08 GIUGNO AL 14 GIUGNO 2026

Settimana complessivamente instabile nei primi tre giorni, con fenomeni significativi limitati ai rilievi e all'Alta Pianura. Temperature nel complesso leggermente superiori alla media. **Nei prossimi giorni** tempo complessivamente stabile e caldo, con un poco di instabilità più diffusa nella giornata di **venerdì 19**. Tra **sabato 20** e l'inizio della prossima settimana ulteriore consolidamento dell'anticiclone, con temperature in ulteriore aumento.

PROV	ALT.SLM	STAZIONE	Tn ass		Tn med	Tx ass	g Tx ass	Tm med	VV max		Rtot	VV med
	[m]		[°C]	g Tn ass	[°C]	[°C]		[°C]	[m/s]	g VV max	[mm]	[m/s]
BG	211	Bergamo	14,8	11/6	17,2	31,2	13/6	27,9	13,6	10/6	25,2	2,3
BG	1180	Castione della Presolana	8,2	11/6	10,7	24,5	13/6	20,8	-	-	70,2	-
BG	1682	Foppolo	6,2	11/6	9,2	21,2	13/6	16,9	-	-	95,2	-
BG	1824	Passo S.Marco	3,4	11/6	8,4	18,5	13/6	14,2	19,8	10/6	63,0	4,2
BG	197	Sarnico	16,0	11/6	18,2	31,0	13/6	27,8	-	-	11,8	-
BG	1784	Valbondione	6,1	12/6	9,1	19,5	13/6	15,2	-	-	62,6	-

	Temperatura dell'aria [°C]			Umidità atmosferica [%]			Bagn. fogliare sup	Bagn. fogliare inf	Pioggia (mm)
	Media	Max	Min	Media	Max	Min	Ore	Ore	Totale
09/06/2026	23,2	28,2	18,1	70,5	85,5	55,6	7	6	0
10/06/2026	19,7	24,6	12,1	77	90,4	61,1	6	5	12,8
11/06/2026	18,4	25,5	11,3	53,2	78,1	34,7	0	0	0
12/06/2026	19,7	27,1	12,4	59	79,4	41	0	0	0
13/06/2026	22,6	31,4	14,4	60	82,6	34,6	6	2	0
14/06/2026	22,9	29,6	15,8	59,5	78,6	41,4	5	0	0
15/06/2026	22,4	30,2	14,3	57,3	77,9	27,4	6	2	0

Dati meteo capannina ERSAF di Scanzorosciate (BG)


CONSORZIO TUTELA VALCALEPIO

24060 S. PAOLO D'ARGON (BG), ITALIA – VIA BERGAMO, 10 – TEL. 035/953957 - FAX: 035/951592
E-mail: ctv@valcalepio.org – Sito internet: www.valcalepio.org
COD. FISCALE 80029970169, P.IVA 03530290166



Consorzio ai sensi art. 19 Legge 164/92
Disciplinare D.M. 2/8/93 – G.U. 28/8/93 n. 200

Previsioni per la settimana (estratte dal bollettino agrometeorologico della regione Lombardia)



Un'area di alta pressione è collocata sul bacino occidentale del Mar Mediterraneo, e garantisce condizioni di tempo prevalentemente stabile e soleggiato; queste, a tratti, sono interrotte da transiti di code di perturbazioni che contribuiscono a rendere il cielo più nuvoloso e maggiormente incline alla possibilità di precipitazioni, spesso sotto forma di rovescio o temporale. Le fasi precipitative più probabili saranno registrate nel corso del pomeriggio di **giovedì 18** sui settori alpini e prealpini, e nella seconda parte di **venerdì 19**, in maniera più diffusa, su tutta la regione. Prevalenza di condizioni stabili invece previste per il fine settimana, salvo ancora un poco di instabilità su Alpi, **sabato 20**. Temperature in costante e progressivo aumento nel corso della settimana, salvo un locale calo associato alle precipitazioni nel corso di **venerdì 19**. Tra **sabato 20** e **martedì 23** temperature significativamente superiori alla media.

Indicazioni legislative

I disciplinari di produzione integrata in vigore possono essere trovati al link:

<https://fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr/protezione-delle-colture-e-del-verde/norme-tecniche-di-difesa-e-diserbo>

Con decreto n.3864 del 25/03/2026 sono stati approvati i **Disciplinari di Produzione integrata** per la Regione Lombardia, validi per il 2026.

I disciplinari, costituiti da una sezione relativa alle tecniche agronomiche e una specifica per la difesa e il diserbo, costituiscono il riferimento regionale per l'applicazione delle disposizioni previste da:

- **Piano strategico della PAC 2023-2027**, in particolare dell'intervento **SRA01**;
- **Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata** (SQNPI);
- **Programmi operativi delle organizzazioni di produttori** (OP) e **associazioni di organizzazioni di produttori** (AOP) in ambito **OCM**.

I disciplinari, comprendenti le **"Norme tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture"** e le **"Norme tecniche agronomiche di produzione integrata"**, indicano i criteri d'intervento, le soluzioni agronomiche e le strategie da adottare per la difesa e il diserbo integrato delle infestanti, nell'ottica di un minor impatto verso l'uomo e l'ambiente, consentendo di ottenere, al contempo, produzioni economicamente sostenibili.

Impiego del Rame

A seguito all'entrata in vigore del Reg UE 2025/1489 l'autorizzazione all'immissione in commercio della sostanza attiva è prorogata al 31 giugno 2029. "Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione

CONSORZIO TUTELA VALCALEPIO

24060 S. PAOLO D'ARGON (BG), ITALIA – Via BERGAMO, 10 – TEL. 035/953957 - FAX: 035/951592

E-mail: ctv@valcalepio.org – Sito internet: www.valcalepio.org

COD. FISCALE 80029970169, P.IVA 03530290166



Consorzio ai sensi art. 19 Legge 164/92
Disciplinare D.M. 2/8/93 – G.U. 28/8/93 n. 200

per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agro-climatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. **Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno"**

Se si utilizzano prodotti fertilizzanti contenenti rame metallico (Cu) la quantità distribuita deve essere registrata perché concorre al raggiungimento del limite previsto dalle norme fitosanitarie (tali quantitativi devono essere indicati nelle schede di registrazione della difesa e tali registrazioni devono essere conservate per almeno 7 anni).

Quaderno di campagna informatizzato

La Commissione Europea con Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/2203 del 31 ottobre 2025 ha posticipato al 1° gennaio 2027 l'entrata in vigore dell'obbligo per gli utilizzatori professionali di adottare il Quaderno di Campagna dell'Agricoltore (QDCA) informatizzato; anche per il 2026 è prevista l'adesione volontaria.

Controllo funzionale e taratura obbligatoria delle macchine irroratrici

Le macchine irroratrici (elencate nell'allegato al DM 4847 del 3/03/2015) devono essere sottoposte al **Controllo Funzionale obbligatorio** presso i Centri Prova autorizzati, con le seguenti scadenze:

- l'intervallo dei controlli non deve superare i cinque anni fino al 31/12/2020, successivamente non deve superare i **tre anni**.
- le attrezzature **nuove** devono essere sottoposte a controllo **entro 5 anni dalla data acquisto**.
- le attrezzature impiegate per attività in **conto terzi** devono essere ricontrollate periodicamente ad intervalli **non superiori a 2 anni**.
- le irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono prodotti fitosanitari in forma localizzata, altre irroratrici con banda trattata inferiore o uguale a tre metri, **le irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree**, devono essere controllate **ogni sei anni**. Se dette attrezzature sono in uso a contoterzisti, i controlli funzionali dovranno essere effettuati ogni quattro anni.

Sono esonerate dal Controllo Funzionale periodico obbligatorio:

- le irroratrici spalleggiate azionate dall'operatore, a leva manuale;
- le irroratrici spalleggiate a motore ma prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti in colture protette.

Per aderire al bando SRA e alla certificazione SQNPI necessaria per accedere ai contributi le macchine irroratrici devono altresì essere sottoposte **a taratura strumentale effettuata presso un centro prova** in genere contestualmente al controllo funzionale. In tal caso la durata della taratura coincide con la durata del controllo funzionale.



Trattamenti obbligatori Scafoideo – V BOLLETTINO N 8 DEL 26-5-26



Consorzio ai sensi art. 19 Legge 164/92
Disciplinare D.M. 2/8/93 - G.U. 28/8/93 n. 200

Fenologia della vite nel territorio bergamasco

Precoci (Pinot Gr. e B., Chardonnay)	Medie (Merlot, Inc. Manz. Inc. Terzi)	Tardive (Cabernet S.)
Tra pre chiusura grappolo e chiusura grappolo (BBCH 77-79)	Tra acini delle dimensioni di un pisello e pre chiusura grappolo (BBCH 75-77)	Tra grano di pepe e acini delle dimensioni di un pisello (BBCH 73-75)
		
Chardonnay in chiusura grappolo a Tagliuno Fotografia scatta il 15-6-26	Merlot in pre chiusura grappolo a Torre de Roveri Fotografia scatta il 15-6-26	Cabernet a Costa di Mezzate con acini delle dimensioni di un pisello Fotografia scatta il 15-6-26

Fenomeni meteo dell'ultima settimana

Nella Giornata di mercoledì 10 giugno una grandinata piuttosto violenta ha interessato il quadrante orientale della zona viticola bergamasca. Il fenomeno è stato particolarmente intenso tra Chiuduno e Grumello del Monte, dove l'intensità è stata piuttosto rilevante.

Nei riquadri sotto alcune immagini scattate nella giornata di lunedì 15 giugno, dove sono evidenti i danni rilevati in vigneto.



CONSORZIO TUTELA VALCALEPIO

24060 S. PAOLO D'ARGON (BG), ITALIA – VIA BERGAMO, 10 – TEL. 035/953957 - FAX: 035/951592
E-mail: ctv@valcalepio.org – Sito internet: www.valcalepio.org
COD. FISCALE 80029970169, P.IVA 03530290166



Consorzio ai sensi art. 19 Legge 164/92
Disciplinare D.M. 2/8/93 – G.U. 28/8/93 n. 200



Danni rilevati durante il sopralluogo di lunedì 15 giugno sul territorio bergamasco sia su grappolo che su foglia. Essendo ancora in fase erbacea, gli acini colpiti tenderanno a seccare e non dovrebbero causare problemi di marciumi secondari.

Aspetti agronomici

Gestione del terreno

Dove si vuole limitare la competizione per acqua e nutrienti, si consiglia di procedere allo sfalcio dell'erba. Qualora invece si volesse cercare di ridurre la vigoria delle viti, il consiglio è di lasciar sviluppare, ovviamente nei limiti del possibile, il cotico erboso; in questo modo si limita la disponibilità di risorse per la vite, riducendo al contempo la capacità vegetativa.

In vigneti gestiti limitando l'uso del diserbo o in agricoltura biologica si consiglia di eseguire lavorazioni interceppo per evitare l'insediarsi delle infestanti nel sottofila. Si rammenta che le lavorazioni del sottofila, perché siano efficaci, devono essere effettuate con un cotico erboso non completamente affrancato e quando si prevedono almeno 3-4gg di bel tempo.

Si ricorda che, per il rispetto dei Disciplinari di Produzione Integrata per le colture arboree:

1. Negli appezzamenti con pendenza media superiore al 30% è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila, anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci. All'impianto sono ammesse esclusivamente lavorazioni puntuali per la messa a dimora delle piante o per l'asportazione dei residui della coltura precedente. Nei primi due anni di impianto l'inerbimento può essere realizzato anche a filari alterni.
2. Negli appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% e il 30% è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila (anche spontaneo gestito con sfalci). In condizioni di scarsa piovosità durante il periodo vegetativo (*), tale obbligo non si applica sui terreni a tessitura argillosa, argillosa-limoso, argillosa-sabbiosa, franco-limoso-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa-argillosa (classificazione USDA). In questi casi, nel periodo primaverile-estivo, sono consentite lavorazioni a filari alterni, fino a una profondità massima di 30 cm, con funzione di aerazione e decompattazione del terreno. Per la valutazione della piovosità è possibile consultare i dati ufficiali della rete di monitoraggio di ARPA Lombardia. Le operazioni di semina e interrimento delle colture da sovescio sono ammesse; tuttavia, la pratica del sovescio è consentita solo a filari alterni. Nei primi due anni di impianto l'inerbimento può essere realizzato anche a filari alterni.
3. Negli appezzamenti con pendenza media inferiore al 10% è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale, al fine di contenere la perdita di elementi nutritivi. Sono consentite le operazioni di semina e interrimento del sovescio. L'obbligo di inerimento non si applica nei primi due anni di impianto della coltura arborea.
4. Sui terreni dove vige l'obbligo di inerimento dell'interfila sono ammessi interventi localizzati di interrimento dei concimi sulla fila.
5. In presenza di flora spontanea in fiore, il cotico erboso deve essere sfalcato prima dell'esecuzione di trattamenti fitosanitari.

(*) aree caratterizzate da precipitazioni cumulate medie < 250 mm nel decennio 2011-2020.

CONSORZIO TUTELA VALCALEPIO

24060 S. PAOLO D'ARGON (BG), ITALIA – VIA BERGAMO, 10 – TEL. 035/953957 - FAX: 035/951592

E-mail: ctv@valcalepio.org – Sito internet: www.valcalepio.org

COD. FISCALE 80029970169, P.IVA 03530290166



Consorzio ai sensi art. 19 Legge 164/92
Disciplinare D.M. 2/8/93 – G.U. 28/8/93 n. 200

Gestione della chioma

Mantenere le forme in parete cimate. Si consiglia, con il perdurare della fase calda oltre la media, di non manipolare la fascia grappolo (non defogliare e non esporre i grappoli alla radiazione diretta).

Per ridurre lo stress termico durante i picchi di calore è possibile applicare Caolino e Polvere di roccia ad azione riflettente. Questo permette di riflettere parte della luce e riduce la temperatura raggiunta degli organi vegetali (sia foglie che grappoli).



Le alte temperature degli scorsi giorni hanno causato le prime scottature ai grappoli, soprattutto dove defogliato meccanicamente o dove è stato distribuito zolfo in polvere. D'ora in avanti, data la sensibilità dei grappoli in questa fase, si consiglia di evitare interventi di defogliazione in fascia grappolo. Allo stesso modo, in previsione di ondate di calore, si consiglia di intervenire con caolino/polvere di roccia/zeolite per ridurre la temperatura superficiale dei grappoli e delle foglie e evitare scottature e stress termici oltre che ai grappoli anche all'apparato fotosintetico.

Difesa

Si raccomanda di utilizzare principi attivi ammessi dai disciplinari di difesa integrata e rispettare sempre il numero massimo di trattamenti per ogni sostanza o gruppo di sostanze attive. Devono essere rispettate le dosi e le modalità di applicazione riportate in etichetta. Si ricorda l'importanza di attuare strategie anti-resistenza utilizzando prodotti con diverso meccanismo di azione!

Peronospora

Il rischio di infezione al momento è basso. Le precipitazioni della scorsa settimana sono state potenziali avvisi di nuove infezioni, ma il meteo previsto fa presagire a un periodo in cui la probabilità di nuovi avvisi di cicli infettivi rimane comunque basso. Nonostante ciò il rischio rimane basso, data la scarsa presenza di lesioni in campo. Prestare particolare attenzione qualora si verificassero diverse ore consecutive di bagnatura fogliare anche in



Consorzio ai sensi art. 19 Legge 164/92
Disciplinare D.M. 2/8/93 - G.U. 26/8/93 n. 200

assenza di precipitazione!

Durante i sopralluoghi eseguiti sul territorio nella giornata di Lunedì 15 giugno non si sono rilevate particolari problematiche legate alla peronospora, salvo locali infezioni sporadiche nelle zone storicamente molto soggette al patogeno. Anche in queste zone le problematiche sembrano essere, comunque, contenute.



Macchie d'olio rilevate sul territorio durante i sopralluoghi. Le lesioni di peronospora sono sporadiche e localizzate tipicamente negli areali ad alta/altissima pressione di malattia.

Foto scattate sul territorio bergamasco il 15-6-26

Difesa Integrata Proseguire il programma di difesa in funzione dello stato di sviluppo del vigneto. Nel caso sia terminato l'effetto del precedente trattamento, si consiglia di ripristinare la protezione utilizzando prodotti si consiglia di mantenere protetta la vegetazione, in particolare quella neoformata e il grappolo in via di sviluppo, in previsione di ulteriori piogge con prodotti sistemici quali:

- metalaxil-m o benalaxil-m (max 3 trattamenti come somma di, metalaxil-m, benalaxil-m)
- FLuopicolide (max 2 trattamenti in alternativa al Metalaxil)
- Oxithiapiprolin (max 2 trattamenti)
- Negli areali notoriamente a bassa pressione di malattia possono essere usati Fosetil-al o Fosfonati

Aggiungere, qualora non fosse già presente nel formulato commerciale, un prodotto di copertura come

- Folpet, Dithianon, Fluazinam massimo 6 all'interno della famiglia
- Zootamide max 4 trattamenti, Amectotradina massimo 3 interventi

Qualora si fossero riscontrate delle lesioni fogliari, si consiglia di aggiungere un prodotto curativo come Cimoxanil, Mandipropamide.



Difesa Biologica Si consiglia di intervenire con prodotti rameici a copertura delle piogge dove la vegetazione ha raggiunto un sufficiente grado di sviluppo. Si ricorda che una pioggia superiore a 20-30 mm deve essere considerata dilavante. Ne consegue la necessità di ripetere il trattamento. In previsione di piogge abbondanti o di periodo relativamente lunghi con alta probabilità di precipitazione si consiglia di utilizzare prodotti autorizzati in biologico additivati di adesivante per migliorare la persistenza del prodotto oppure adesivanti biologici a base di Pinolene.

CONSORZIO TUTELA VALCALEPIO

24060 S. PAOLO D'ARGON (BG), ITALIA – Via BERGAMO, 10 – TEL. 035/953957 - FAX: 035/951592
E-mail: ctv@valcalepio.org – Sito internet: www.valcalepio.org
COD. FISCALE 80029970169, P.IVA 03530290166



Consorzio ai sensi art. 19 Legge 164/92
Disciplinare D.M. 2/8/93 – G.U. 28/8/93 n. 200


Possono essere utilizzati in abbinamento al rame prodotti a base di Cerevisane che espletano un'azione sistemica come induttori di resistenza. Si ricorda di applicare gli induttori di resistenza prima dei potenziali eventi infettivi a blocchi di 2-3 trattamenti alternati da pause di 10-15 gg.

[Per caratteristiche delle diverse tipologie di rame v. bollettino 3-2026](#)

Oidio

Il rischio di infezione al momento è molto medio-alto. I modelli prevedono una elevata dose di inoculo presente nei prossimi giorni, derivante dai conidi sviluppatasi dalle infezioni primarie e secondarie. In quasi tutte le zone potrebbero quindi iniziare in modo massiccio i cicli secondari della malattia. Prestare particolare attenzione all'eventuale presenza del patogeno in campo, utilizzando varietà notoriamente più sensibili alla malattia, come Chardonnay, che manifesta i sintomi prima di altre cultivar.

Nei sopralluoghi eseguiti sul territorio nella giornata di ieri si sono notate sporadiche lesioni fogliari negli areali tipicamente soggetti alla malattia, ma anche per questo patogeno la situazione sembra essere generalmente sotto controllo. Nonostante questo, si consiglia di mantenere elevata la guardia, per evitare l'insediarsi della malattia. Si ricorda che l'acino è sensibile all'attacco del patogeno fino all'invasatura.



Lesione di oidio su chardonnay. A sinistra acini attaccati dalla malattia. In centro aspetto di una foglia con lesioni (macchie più chiare), con l'inizio della presenza della tipica patina biancastra. A sinistra le tipiche necrosi delle nervature nella pagina inferiore.
Foto di repertorio.

Difesa Integrata Si consiglia di intervenire con Spiroxamina (movimento sistemico all'interno della pianta) associati a Zolfo bagnabile. Con temperature in aumento si può passare all'utilizzo di altri prodotti con traslocazione rapida all'interno dei tessuti della pianta come i triazoli (penconazolo, tetraconazolo, Difenconazolo, tebuconazolo, mefentrifluconazolo) oppure, con infezioni in atto utilizzare prodotti eradicanti come Bupirimate o Meptyldinocap (utilizzabile fino al 30-9-26). In alternativa, con acino in accrescimento, utilizzare prodotti attivi in tensione di vapore e con alta affinità alla cere come Proquinazid e Metrafenone. Si consiglia, per ridurre il rischio di insorgenza di resistenze, l'utilizzo dei principi attivi sopra elencati associati a prodotti di copertura come lo zolfo e rispettare il numero massimo prescritto di trattamenti per sostanza attiva. In zone sensibili al patogeno, in assenza di precipitazioni, intervenire con zolfo in polvere 25kg/ha.



Consorzio ai sensi art. 19 Legge 164/92
Disciplinare D.M. 2/8/93 - G.U. 28/8/93 n. 200

Difesa Biologica Si consiglia di intervenire con un trattamento a base di zolfo bagnabile alla dose di 4-6kg/ha. In previsione di piogge abbondanti o di periodi relativamente lunghi con alta probabilità di precipitazione si consiglia di utilizzare prodotti autorizzati in biologico additivati di adesivante per migliorare la persistenza del prodotto sugli organi vegetali.

Possono essere eventualmente utilizzati prodotti a base di COS-OGA, oppure di estratti di Laminaria che svolgono un'azione di induttori di resistenza. Si ricorda di applicare gli induttori di resistenza prima dei potenziali eventi infettivi a blocchi di 2-3 trattamenti alternati da pause di 10-15 gg.

In caso di previsione di bel tempo intervenire con zolfo in polvere alla dose di 25kg/ha.

Scafoideo/Flavescenza dorata

Oltre a mettere in atto la difesa obbligatoria, è fondamentale andare a indentificare e rimuovere al più presto le piante sintomatiche. In campo possono già essere rilevati i sintomi di tale problematica.



Esempi di piante sintomatiche rilevate durante i sopralluoghi di lunedì 15 giugno e immediatamente rimosse. Attualmente i sintomi sono piuttosto evidenti e caratteristici.

LOTTA OBBLIGATORIA SCAFOIDEO

Come accennato nella sezione "indicazioni legislative" è fatto obbligo effettuare i trattamenti obbligatori per il controllo della patologia.

In particolare si sottolinea che:

- Le aziende in "Lotta integrata obbligatoria" e "in Lotta integrata volontaria" in provincia di Bergamo devono effettuare 2 trattamenti insetticida obbligatorio contro Scafoideo. Il periodo consigliato per l'esecuzione del **primo trattamento va dal 2 al 14 giugno**, mentre **il secondo dal 17 al 29 giugno**, mantenendo un intervallo di circa 14 giorni tra i due trattamenti.
- Le aziende che aderiscono alla lotta biologica, oppure le aziende che utilizzano solo principi attivi ammessi in biologico per il controllo del vettore, devono necessariamente effettuare 3 trattamenti insetticidi contro Scafoideo, **iniziando dal 2 al 14 giugno e proseguendo a cadenza di 12-14 gg.**

Si raccomanda di rispettare i principi delle buone pratiche agricole, in particolare:

CONSORZIO TUTELA VALCALEPIO

24060 S. PAOLO D'ARGON (BG), ITALIA – VIA BERGAMO, 10 – TEL. 035/953957 - FAX: 035/951592
E-mail: ctv@valcalepio.org – Sito internet: www.valcalepio.org
COD. FISCALE 80029970169, P.IVA 03530290166



Consorzio ai sensi art. 19 Legge 164/92
Disciplinare D.M. 2/8/93 - G.U. 28/8/93 n. 200

- Utilizzare unicamente prodotti registrati sull'avversità, che recano in etichetta Scafoideo o Cicaline della vite
- Distribuire il prodotto in modo omogeneo, bagnando anche i polloni dove si può trovare il vettore
- Utilizzare adeguate quantità di soluzione fitoiatrica e verificare l'adeguata copertura di tutti gli organi vegetali.
- Non trattare in fioritura per salvaguardare i pronubi eventualmente presenti
- Si raccomanda di sfalcare le essenze erbacee, spontanee o seminate, presenti nel sottofila, qualora fossero in fioritura, sempre per salvaguardare i pronubi.

Difesa Integrata Le aziende che aderiscono in regime di difesa integrata volontaria possono utilizzare i seguenti prodotti:

- Sali potassici degli acidi grassi *
- Piretrine pure*
- Beauveria bassiana*
- Olio essenziale di arancio dolce *
- Acetamiprid, massimo 2 interventi
- Flupyradifurone
- Azadiractina*
- Tau-Fluvalinate, Deltametrina, massimo 2 interventi
- Lambda Cialotrina, Etefenprox, Esfenvalerate massimo un intervento

**prodotti autorizzati in biologico*

Scafoideo (Scaphoideus titanus)	Nelle aree delimitate dal SFR (in base a quanto stabilito nel Decreto di lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata) eseguire gli interventi obbligatori previsti.	Sali potassici di acidi grassi	*	(*) Efficacia limitata alle forme giovanili (fino alla II e III età)
		Piretrine pure		
		Maltodestrina		
		Beauveria bassiana 74040		
	In caso di presenza ammessi al massimo due interventi anche nelle altre zone.	Olio essenziale di arancio dolce		
		Azadiractina A		
	Primo intervento (Rispettare il periodo della fioritura): circa 35 giorni dopo la chiusura delle uova	Flupyradifurone		
		Acetamiprid	2	
		Taufluvalinate	2	
		Deltametrina	2	
	Secondo intervento: Intervenire con un prodotto adutticida dopo circa 15 - 25 giorni dal primo trattamento, a seconda dell'infestazione presente e della persistenza del prodotto impiegato precedentemente	Lambda-cialotrina		(*) Tra tutti i Piretroidi; (**) in alternativa tra Lambda-cialotrina, Esfenvalerate ed Etofenprox, in quanto sostanze candidate alla sostituzione
		Etofenprox	1**	
		Esfenvalerate		
	Porre attenzione al rispetto delle api.			

Attenersi al numero massimo di interventi stabilito dal disciplinare

Di seguito una sintesi delle principali caratteristiche di alcuni prodotti utilizzabili:

Sostanza attiva	Classificazione in base alla modalità di azione (MoA)	BIO	Efficacia			Caratteristiche
			giovani	adulti	persistenza	
Etofenprox	3A	NO	+++	+++	++	Scarsa selettività, può favorire lo sviluppo del ragnetto rosso
Taufluvalinate	3A	NO	+++	+	++	Piretroide, selettivo nei confronti di api e altri

CONSORZIO TUTELA VALCALEPIO

24060 S. PAOLO D'ARGON (BG), ITALIA – Via BERGAMO, 10 – TEL. 035/953957 - FAX: 035/951592

E-mail: ctv@valcalepio.org – Sito internet: www.valcalepio.org

COD. FISCALE 80029970169, P.IVA 03530290166



Consorzio ai sensi art. 19 Legge 164/92
Disciplinare D.M. 2/8/93 - G.U. 26/8/93 n. 200

	4A					pronubi. Agisce per contatto ed ingestione.
Acetamiprid		NO	+++	+++	++	Neonicotinoide, sistemico, agisce per ingestione e per contatto.
Piretro Naturale		SI	+++	++	+	Agisce per contatto, scarsa persistenza. Attenzione alle modalità del trattamento.
Flupyradifurone	4D	NO	+++	+++	++	Sistemico e traslaminare, agisce per contatto ed ingestione, con rapido blocco dell'attività degli insetti
Azadiractina	UN	SI	+	-	+	Agisce come regolatore di crescita, principalmente per ingestione, ma anche per contatto. Possiede inoltre azione anti-alimentare e repellente
Sali potassici degli acidi grassi	---	SI	+ / ++	-	+	Agisce per contatto. Ottimo potere abbattente ma scarsa attività residuale. Prontamente biodegradato, non persiste nell'ambiente
Beauveria bassiana ceppo ATCC 74040	---	SI	+++	++	+	Preparato microbiologico. Agisce per contatto, non ha azione abbattente. Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per un periodo di 120 giorni, dal 22 maggio al 18 settembre 2020
Olio essenziale di arancio dolce	---	SI				Agisce per contatto, prodotto di nuova registrazione sul patogeno, efficacia da valutare.

CONSORZIO TUTELA VALCALEPIO

24060 S. PAOLO D'ARGON (BG), ITALIA – VIA BERGAMO, 10 – TEL. 035/953957 - FAX: 035/951592
E-mail: ctv@valcalepio.org – Sito internet: www.valcalepio.org
COD. FISCALE 80029970169, P.IVA 03530290166



Consorzio ai sensi art. 19 Legge 164/92
Disciplinare D.M. 2/8/93 – G.U. 28/8/93 n. 200

Difesa Biologica si deve intervenire obbligatoriamente per 3 volte partendo dal momento indicato e proseguendo a distanza di 12-14gg. Si raccomanda di monitorare l'eventuale presenza di adulti, con trappole cromotropiche, per definire l'eventuale necessità di procedere con ulteriori trattamenti abbattenti.

Si sottolinea l'importanza dell'esecuzione del trattamento per evitare danni irreversibili al vigneto e al patrimonio viticolo collettivo. È fatto obbligo mantenere tracciabilità dell'esecuzione dei trattamenti mediante registrazione sul quaderno di campagna e il servizio fitosanitario provvederà alla verifica a campione del rispetto dell'obbligo sopra riportato. Oltre a causare l'inevitabile danno al vigneto e alla collettività, il non rispettare questi obblighi comporta la possibilità a sanzione pecuniaria da 1000 a 6000€.

Per contenere la diffusione di flavescenza dorata, oltre alla sacrosanta lotta obbligatoria al vettore si consiglia di prestare particolare attenzione alla presenza di piante sintomatiche ed è opportuno rimuoverle al più presto.

Tiginoletta della vite

Continua il volo di *Lobesia botrana* (tiginoletta della vite).. Premesso che la strategia che risulta essere più efficace nel controllo del lepidottero è la confusione sessuale, qualora non la si fosse installata si consiglia di valutare attentamente la situazione del proprio vigneto e considerare un eventuale trattamento insetticida in funzione della presenza del patogeno. I modelli prevedono la nascita larvale nei prossimi giorni. La soglia di intervento nei vigneti solitamente infestati è pari alla presenza di uova o fori di penetrazione, mentre nei vigneti solitamente non infestati corrisponde al raggiungimento del 5% di grappoli infestati da uova e/o larve o con fori di penetrazione. Al superamento della soglia intervenire con Clorantprilprole (Max 1) oppure *Bacillus thuringiensis*, in alternativa utilizzare Spinosad o Spinetoram (Max 1) o Emamectina (*) (Max 2). Tra Spinosad e Spinetoram Max 3 interventi.

I monitoraggi effettuati sul territorio hanno mostrato una incidenza leggermente inferiore rispetto alla norma delle ultime stagioni di grappoli colonizzati con i tipici "nidi". Questo ci fa ben sperare sul prosieguo della stagione, ma la non si deve abbassare l'attenzione, considerando la pericolosità del patogeno.



CONSORZIO TUTELA VALCALEPIO

24060 S. PAOLO D'ARGON (BG), ITALIA – VIA BERGAMO, 10 – TEL. 035/953957 - FAX: 035/951592
E-mail: ctv@valcalepio.org – Sito internet: www.valcalepio.org
COD. FISCALE 80029970169, P.IVA 03530290166



Consorzio ai sensi art. 19 Legge 164/92
Disciplinare D.M. 2/8/93 – G.U. 26/8/93 n. 200

Tignoletta della vite (indicate dalla freccia) fotografata nella giornata di lunedì 16-6-25 in zona Scanzorosciate. A destra un ingrandimento di un esemplare nella trappola a feromoni.

Per qualsiasi chiarimento potete rivolgervi all'indirizzo mail: marco_galbignani@hotmail.it

San Paolo d'Argon, 16 giugno 2026

Marco Galbignani
Dottore Agronomo